

COMPLICATIONS

- Infection
- Hématome
- Mauvaise cicatrisation
- Liées à l'implant : rupture, contracture capsulaire péri-prothétique qui peut former des plis ou des vagues ou une déformation du sein avec des douleurs associées
- Troubles de la sensibilité mamelonnaire
- Une insatisfaction face au résultat esthétique peut motiver une réintervention

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET SPORTIVES

Une convalescence et un arrêt de travail durent 8 à 10 jours. L'activité sportive peut être reprise après 1 à 2 mois. Le soutien-gorge doit être porté jour et nuit pendant 1 mois.

EN VUE DE L'INTERVENTION, PENSEZ À

- Discuter avec le chirurgien des précautions à adopter pour les traitements médicamenteux en cours
- Être à jeun, c'est-à-dire ne plus manger ni boire dès minuit la veille de l'intervention
- Cesser de fumer à partir de 1 à 2 mois avant l'intervention.

CONSULTEZ VOTRE CHIRURGIEN

- Si votre température est à **plus de 38°C** ou **que vous ressentez des frissons**
- Si vous observez un **écoulement** au niveau de la cicatrice
- Si vous avez une perception de **chaleur** et observez une **rougeur** ou un **gonflement** au niveau de la région opérée

CONTACT


SECRÉTARIAT : TÉL. +41 21 804 26 55
EHC – HÔPITAL DE MORGES
CHEMIN DU CRÊT 2
CH-1110 MORGES

CHIRURGIE D'AUGMENTATION MAMMAIRE PAR PROTHÈSES

FICHE D'INFORMATION AU PATIENT

Vous avez discuté avec le chirurgien de la **chirurgie d'augmentation mammaire par prothèses** et de la technique opératoire.

Ce document fournit les informations-clés de cette intervention.



<https://friedmancenter.org/about-breast-reconstruction/implant-procedures/implant-placement-above-or-below-the-muscle/>

DÉFINITION

La chirurgie d'augmentation mammaire vise à corriger le volume et la forme des seins qui sont insuffisamment développés par rapport à la morphologie de la patiente. L'allaitement reste possible. Une hospitalisation d'une nuit est habituellement suffisante. Cette chirurgie à but esthétique n'est pas prise en charge par l'assurance.

Une opération pour changer les implants à distance est souvent nécessaire à cause d'une réaction inflammatoire de votre corps contre l'implant qui est conçu comme un corps étranger. Votre corps ainsi forme une coque autour de l'implant qui risque de déformer le sein et de devenir douloureux. L'implant risque également de se rompre et ainsi nécessite qu'il soit changé.

RÉSULTATS

Un délai de 3 mois est nécessaire pour apprécier le résultat, le temps nécessaire à l'assouplissement des seins et à la stabilisation des prothèses. Si le sein est ptotique, l'implant mammaire ne va pas remonter le sein.

AVANTAGES

- L'implant sert à augmenter la taille des seins de manière instantanée selon le volume souhaité
- Les cicatrices sont cachées dans le pli sous-mammaire, ou autour de l'aréole (plus visibles)

DÉSAVANTAGES

- Risques intrinsèques à la chirurgie
- Risque de « capsulite » qui est dû à votre corps qui mène une réaction inflammatoire induite par l'implant qui est conçu comme un corps étranger ; ceci peut déformer les seins et causer des douleurs nécessitant un changement des implants
- Risque de rupture de l'implant nécessitant un changement de celui-ci

L'INTERVENTION CHIRURGICALE

PRÉOPÉRATOIRE

La taille et le type des prothèses, l'emplacement de la cicatrice, la position de la prothèse par rapport au muscle sont décidés en consultation en fonction de l'anatomie et des désirs de la patiente. Une imagerie mammaire préopératoire peut être indiquée.

OPÉRATION

L'opération dure une à deux heures.

L'implant est introduit par une courte incision située dans le pli sous-mammaire ou autour de l'aréole.

Après le décollement du tissu, la prothèse est posée devant ou derrière le muscle.

Un drain est laissé en place pendant quelques jours.

Le pansement est recouvert par un bandage circulaire.

POSTOPÉRATOIRE

Il peut y avoir des douleurs pendant les premiers jours après l'opération, surtout si la prothèse est placée derrière le muscle. Un traitement antalgique est suffisant. Des œdèmes et des bleus des seins ainsi qu'une gêne à l'élévation des bras sont possibles. Le premier pansement est allégé après 1 ou 2 jours et remplacé par un soutien gorge à garder pendant 1 mois, jour et nuit. Les fils sont retirés 2 semaines après l'opération.